

엠마 듀오크림 450g

리도카인(USP) 25mg, 프릴로카인(USP) 25mg

1. 주사바늘 삽입 시 또는 표재성 외과적 처치 시 피부의 표면마취
2. 생식기 점막 표면마취(예 : 콘딜롬 제거전)
3. 세척이나 표재성 수술(예 : 피브린, 농, 괴사부위의 제거)에 앞서 다리궤양의 표면마취



Emma Duo
Lidocain 25mg, Prilocaine 25mg

엠마 듀오크림 450g

분류번호 : 전문121

국소마취제

제품명	엠마 듀오크림 / Emma Duo	전문/일반	전문의약품		
표준코드	8806980020036	보험약가	비급여		
성상	흰색의 크림제	ATC코드	N01BB20 : COMBINATIONS		
주성분	이 약 1g 중 리도카인 25mg/g, 프릴로카인 25mg/g				
효능 · 효과	1. 주사바늘 삽입 시 또는 표재성 외과적 처치 시 피부의 표면마취 2. 생식기 점막 표면마취(예 : 콘딜롬 제거전) 3. 세척이나 표재성 수술(예 : 피브린, 농, 괴사부위의 제거)에 앞서 다리궤양의 표면마취				
용법 · 용량	<p>성인</p> <p>1.피부 : 이 약을 적용한 후 밀봉테이프로 덮는다. 적용 부위에 대한 밀봉은 보통 1-3시간 유지되어야 하며 밀봉테이프 제거 후 최소 1시간은 효과가 지속된다. 1)주사바늘 삽입시(예 : 정맥삽관, 채혈) 이 약 약 2g을 최소 1시간, 최대 5시간 적용한다. 2) 표재성 외과적 소수술시(예 : 연속종의 적출) 이 약 1.5-2g/10cm²을 1시간 적용한다. 3) 표재성 외과적 대수술시 (예 : 파열된 피부이식) 이 약 1.5-2g/10cm² 을 최소 2시간, 최대 5시간 적용한다. 2. 생식기 점막 : 콘딜롬 제거시 처치 부위에 이 약 약5~10g을 5-10분간 적용한 후 이 약을 제거하고 즉시 시술을 개시한다. 3. 다리궤양 : 이 약을 적용 한 후 밀봉테이프로 덮는다. 개봉한 투브를 단회로 사용하며 매 조작 후에는 남아있는 크림을 버리도록 한다. 적어도 30분간 1~2g/10cm²을 적용하며 매 치료시마다 10g을 초과하지 않도록 한다. 투과하기 어려운 조직의 다리궤양에 대해서는 적용시간을 60분으로 연장할 수 있으며, 크림 제거 후 10분 이내에 궤양을 세척하도록 한다. 1~2개월간 15번까지 사용했을 때 효과가 감소하거나 국소반응이 증가하지 않았다.</p> <p>3개월-12개월 영아 : 총량 2g, 적용부위 16cm²를 초과하지 않는다.</p>				
사용상의 주의사항	<p>1. 경고</p> <p>메트헤모글로빈혈증국소마취제 사용과 관련하여 메트헤모글로빈혈증 사례가 보고되었다. 모든 환자들은 메트헤모글로빈혈증의 위험이 있으나 글루코스-6-인산탈수효소 결핍증, 선천성 또는 특발성 메트헤모글로빈혈증, 심장 또는 폐손상 환자, 6개월 미만의 영아, 산화제 또는 이들 약물의 대사체 동시 노출 환자는 메트헤모글로빈혈증 임상증상 발생에 더 민감하다. 이런 환자에게 국소마취제를 사용하는 경우 메트헤모글로빈혈증 증상 및 징후에 대해 면밀한 관찰이 권장된다.</p> <p>메트헤모글로빈혈증 징후는 약에 노출 후 즉시 발생하거나 몇 시간 뒤에 발생할 수 있으며 청색의 피부변색 또는 비정상적인 혈액의 착색이 특징이다. 메트헤모글로빈 수치는 계속 상승할 수 있으므로 더욱 심각한 중추신경계 및 심혈관계 이상 사례(발작, 혼수, 부정맥, 사망 등)를 피하기 위해 이 약과 다른 산화제의 투여를 중단하며 즉각적인 치료를 실시한다. 증상 및 징후의 중등도에 따라 환자는 지지요법(즉, 산소요법, 수분공급)에 반응할 수 있다. 더 중증의 임상 양상은 메틸렌 블루, 교환수혈 또는 고압산소 치료를 필요로 할 수 있다.</p> <p>2. 다음 환자에는 투여하지 말 것</p> <p>1) 이 약의 성분 또는 기타의 아미드계 국소마취제에 과민증이 있는 환자 2) 상처가 있는 부위, 점막, 접촉성피부염 또는 아토피피부염 환자 (11. 약동학적 정보 1) 참조) 3) 3개월 이하의 영아 4) 메트헤모글로빈혈증유발 약물(설폰아미드 등)을 투여하는 12개월 이하의 영아 5) 임신 37주 이전에 태어난 조산아</p> <p>3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것</p> <p>1) 빈혈, 메트헤모글로빈혈증 또는 이러한 증상을 유발할 수 있는 약물투여 환자 2) 쇠약자, 고령자, 급성 질환 환자 3) 중증의 간질환 환자 4) 이 약은 피부반응을 일으킬 수 있는 마크로골글리세롤하이드록시스테아레이트를 함유하고 있다. 5) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.</p>				
저장방법	기밀용기, 실온(1-30°C)보관	사용기간	제조일로부터 36 개월	포장단위	450 g/병